

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Bulletin n° 115 du 19/07/90

**MAIS****Pyrale
Acarieus****Peu de pontes
Apparition sur feuilles basses****POMME DE TERRE****Mildiou****Attendre****BETTERAVE****Maladies****Premiers symptômes****LUZERNE****Sitones****Premières morsures****M A I S**

Sortie des soies.

Pyrale**Situation**

Le vol de *pyrale* s'est légèrement intensifié dans quelques secteurs de l'Aube mais reste faible dans la Marne et la Haute-Marne.

LIEU	Captures entre le 10/07 et le 18/07...
51	
Unchair	2
Muizon	2
52	
Choignes	0
Vignory	0
Blessonville	0
10	
Charny le Bachot	2
Chamoy	0
Villehardouin	0

Les pontes fraîches sont rares :

- 2% à Pouy/Vanne (10)
- 2% à St Pouange (10)
- 4% à Choignes (52)
- 0 à Vignory (52)
- 0 à Unchair (51)

Préconisation

Le seuil d'intervention est très rarement atteint. Pas de traitement justifié à l'heure actuelle.

Acarien**Situation**

Les premières formes mobiles sont observées sur feuilles basses en bordure de parcelle dans l'Aube.

Préconisation

Aucun traitement n'est à réaliser pour l'instant.


POMME DE TERRE**Mildiou****Situation**

Aucune contamination théorique enregistrée depuis 9 jours.

Les éventuels cycles en cours sont bloqués par les fortes chaleurs.

Préconisation

Attendre pour intervenir. Seul le retour d'une période pluvieuse justifiera un traitement.



B E T T E R A V E

Maladies

Situation

Les premières taches de *cercosporiose* (région de Reims) et de *ramulariose* (région de Suippes) sont apparues ces derniers jours.

On observe de plus en plus des petits ronds ou des betteraves isolées atteints de *jaunisse*.

Préconisation

Envisager un traitement fongicide complet dès l'apparition des symptômes.

Montée à graines

Situation

Les graines produites par les betteraves montées ont la faculté de se conserver de nombreuses années dans le sol (>10 ans). En moyenne, chaque montée sera à l'origine de 18 autres montées dans la prochaine culture de betterave si vous ne la détruisez pas. En effet, les montées ne sont pas sensibles aux herbicides que vous utiliserez, sélectifs de la betterave.

Préconisation

** Si l'infestation en betteraves montées est faible ou moyenne : un arrachage manuel est conseillé (si ce n'est déjà fait). Les plantes peuvent être laissées dans le champ si vous intervenez dès maintenant.*

** Si l'infestation est forte : le traitement par humectation avec un matériel approprié (appareil à cordes) est possible. Vous emploierez alors une bouillie à base de glyphosate (1 litre de Round-up pour 21 d'eau).*

L U Z E R N E

Stade : semis à levée en cours.

Sitones

Situation

La migration des *sitones* des champs de pois vers les luzernières implantées ou en cours de levée est parfois très importante. Les premières morsures sont observées sur plantules.

Préconisation

Intervenir dès les premiers dégâts.

